

Как выглядит метадон

Метадон выглядит в виде белых (реже – голубых) таблеток или мелкого порошка.

Таблетки содержат 5, 10, 20 и 40 мг действующего вещества. Порошок, поступающий в лечебные учреждения, белого цвета. Уличные торговцы добавляют в него примеси, из-за которых он приобретает различный оттенок.

Вкус - таблетки, порошок горькие на вкус. Запах - таблетки, порошок без запаха.

Метадоновая зависимость – как проявляется

После метадона появляется чувство эйфории, сопровождающееся:

- беспричинным весельем;
- разговорчивостью, болтливостью;
- стремлением выполнять различные действия;
- беззаботностью;
- благодушием;
- погружение в наркотический сон (залипание, втыкание)

Эйфория длится в течение суток и больше. Прекратить действие наркотика невозможно. В дальнейшем человеку становится сложно дышать. Из-за вялости мышц ему трудно поднять руку. У больного утрачивается связь с реальностью. После окончания действия наркотика человек чувствует себя обессиленным. Вскоре организм начнет требовать очередную дозу.

Если развилось привыкание к метадонону, то после окончания его действия у человека возникают страхи, связанные с преследованием. Это очень мучительное состояние: больной идет на все, чтобы достать дозу. Чтобы добыть денег на покупку наркотика, он лжет и часто совершает преступления.

Признаки метадонового наркомана

Человека, злоупотребляющего метадоном, можно обнаружить по таким характерным признакам.

- Подчеркнутое благодушное настроение. Однако, если появляются даже небольшие раздражители, развязное поведение сменяется агрессией.
- Заикание.
- Сужение зрачков (они не реагируют на свет).
- Дезориентация во времени и пространстве.
- Нарушение координации движений, неустойчивость походки.
- Подергивания мышц.
- Бледность и сероватый оттенок кожи.
- Отсутствие аппетита (даже одна мысль о еде вызывает приступ тошноты).
- Появление обильного пота, не связанного с жарой и физической нагрузкой.
- Отеки на стопах и лодыжках.
- Утрата чувствительности к болевым раздражителям.
- Сонливость.